



L'incidenza del tumore maligno del corpo dell'utero è in aumento nelle donne in età peri e postmenopausale

Negli ultimi decenni l'incidenza del tumore maligno del corpo uterino è in aumento sia in Europa che in Italia nelle donne in età postmenopausale; in Toscana nel periodo 2003-2005 questa neoplasia risulta il sesto tumore più frequente fra le donne, dopo i tumori mammari, cutanei (escluso il melanoma), colonrettali, polmonari e gastrici, rappresentando il 3.7% delle diagnosi tumorali femminili (www.ispo.toscana.it).

I dati del Registro Tumori della Regione Toscana (RTRT) relativi ai tumori maligni del corpo dell'utero incidenti nel periodo 2000-2005, analizzati per fasce di età al momento della diagnosi, mostrano un aumento statisticamente significativo dei tassi standardizzati di incidenza del tumore del corpo dell'utero diagnosticato fra le donne con età superiore ai 49 anni (cambiamento annuale del tasso di incidenza standardizzato APC: +3.1)

mentre nelle più giovani, dove il tasso di incidenza di questo tipo di tumori è comunque inferiore, il trend appare in diminuzione, con valori non significativi statisticamente. La prevalenza di sovrappeso ed obesità nelle donne in età peri e postmenopausale, accanto all'utilizzo di terapie ormonali sostitutive,

soprattutto per quanto riguarda alcuni paesi europei, e le modifiche nei comportamenti riproduttivi femminili avvenute negli ultimi anni sono state considerate responsabili almeno in parte dell'aumentata incidenza, suggerendo un'importanza crescente del tumore del corpo uterino in futuro per le donne in questa fascia di età.

A. CALDARELLA, A. CORBINELLI, T. INTRIERI,
L. NEMCOVA, G. MANNESCHI


UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva,
ISPO Istituto Scientifico Prevenzione Oncologica

Bibliografia

Le voci bibliografiche possono essere richieste a: a.caldarella@ispo.toscana.it

TM

**Registro Tumori Regione Toscana:
tumore del corpo dell'utero, trend di incidenza per età**



Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana (www.ispo.toscana.it) relativi alle province di Firenze e Prato. La standardizzazione per età è stata effettuata con il metodo diretto utilizzando la popolazione standard europea. La variazione media annuale dei tassi (APC) viene calcolata adattando ai dati una retta di regressione dei minimi quadrati sul logaritmo naturale dei tassi, utilizzando l'anno di calendario come variabile di regressione, secondo la procedura del software SEER*Stat 6.1