



Gli epitelomi cutanei sono i tumori più frequenti in Toscana

In Toscana quasi un tumore ogni 5 di tutti i tumori maligni che vengono diagnosticati sono epitelomi della cute. Tra questi la maggioranza (circa 86%) sono carcinomi basocellulari mentre circa il 14% sono carcinomi di tipo spinocellulare.

I dati sugli epitelomi sono presumibilmente sottostimati a seguito degli iter diagnostico-terapeutici che non prevedono un ricovero ospedaliero, del fatto che talvolta la rimozione può non essere seguita da un esame istologico (es. diatermocoagulazione, laserterapia) e infine perché solo eccezionalmente sono indicati come causali nei certificati di decesso. Tutto questo, amplificato dal loro notevole numero complessivo, contribuisce a ostacolare una raccolta esaustiva e per questo motivo oltre che per la loro prognosi solitamente benigna spesso non vengono raccolti dai registri tumori e quindi non compaiono nelle statistiche oncologiche.

Nel grafico sono presentati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana relativi alle nuove diagnosi dei principali tumori occorse tra i residenti nelle province di Firenze e Prato negli anni 2003-2004.

Al primo posto, considerando i due sessi assieme, ci sono gli epitelomi della cute, che risultano particolarmente frequenti nelle età adulto-anziana, con una età media alla diagnosi di 70 anni. Il prolungamento della durata della vita, che corrisponde anche all'allungamento del tempo di esposizione cronica alla radiazione solare, aumenta il rischio di epitelomi. In media il ri-

schio di avere una diagnosi di epiteloma nel corso della vita (considerando il periodo dalla nascita agli 84 anni) riguarda 1 residente in Toscana ogni 10.

Oltre che le forme più frequenti in termini di incidenza, in virtù dell'ottima prognosi (la sopravvivenza relativa a 5 anni è del 100% per le

forme basocellulari e del 98,4% per le forme spinocellulari) sono anche quelle quantitativamente più numerosi in termini di prevalenza.

Nonostante la loro frequenza bisogna ricordare che gli epitelomi della cute rappresentano tumori di relativa facile diagnosi e per i quali disponiamo di efficaci strumenti terapeutici.

EMANUELE CROCETTI, GIANFRANCO MANNESCHI


UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva, CSPO Istituto Scientifico Prevenzione Oncologica

Bibliografia

Le voci bibliografiche possono essere richieste a: e.crocetti@csपो.it

TM

Registro Tumori della Regione Toscana (province di Firenze e Prato). Tumori più frequentemente diagnosticati, uomini + donne, 2003-2004



Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana, aggiornati a Aprile 2008 e relativi ai residenti nelle province di Firenze e Prato e agli anni 2003-2004. La standardizzazione per età è stata effettuata con il metodo diretto utilizzando la popolazione standard europea. Le forme morfologiche sono state definite secondo i seguenti codici ICDO-3, Carcinomi basocellulari: 8050-8082, Carcinomi Spinocellulari: 8090-8110, epitelomi nas: 8000. La sopravvivenza relativa a 5 anni è stata calcolata sui casi incidenti nel periodo 1995-2000.