



La sopravvivenza per tumore varia con l'età ma è migliorata in tutte le età nel tempo

Sulla base dei dati del Registro Tumori della Regione Toscana è presentato per il totale dei tumori e per entrambi i sessi l'andamento della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi per fasce d'età in diversi periodi di diagnosi.

EMANUELE CROCETTI, GIANFRANCO MANNESCHI
 UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva,
 ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

La sopravvivenza varia notevolmente nei diversi gruppi d'età, riducendosi nell'età adulto-avanzata, ma in tutte le età si evidenzia un notevole miglioramento avvenuto nel corso del tempo.

Il miglioramento più elevato fra il 1985-1987 e il 2000-2002 si è osservato nella classe 60-69 anni (+21.4%) ma incrementi simili si sono riscontrati in tutte le classi d'età adulta.

Le differenze di sopravvivenza nelle varie fasce d'età sono dovute principalmente al diverso peso percentuale di tumori di diversa prognosi. Ad esempio tra i giovani adulti, tra i quali si riscontrano i valori medi di sopravvivenza più elevati, molti dei tumori più frequenti hanno una sopravvivenza molto buona (ad esempio: linfoma di Hodgkin, melanoma, tiroide, testicolo). Nelle classi d'età adulta e avanzata pesa in maniera crescente la rilevanza

di tumori a prognosi peggiore, come ad esempio quello del polmone. Bisogna anche considerare che una quota dell'incremento della sopravvivenza osservata nel tempo negli adulto-anziani è sicuramente dovuto ad un aumento notevole delle diagnosi di tumori

ad andamento indolente, come è accaduto nel caso del tumore della prostata. Un altro aspetto, che può contribuire a spiegare la sopravvivenza gradualmente decrescente nelle età adulto avanzate è la presenza di patologie non oncologiche concomitanti che possono controindicare l'applicazione dei protocolli terapeutici. Nel complesso in tutte le fasce d'età si è osservato nei pazienti oncologici un incremento della sopravvivenza nel tempo presumibilmente legato all'estensione nella nostra Regione delle attività di diagnosi precoce e alla diffusione e applicazione di protocolli terapeutici efficaci.

Bibliografia

Le voci bibliografiche possono essere richieste a: e.crocetti@ispo.toscana.it

TM

Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana relativi ai casi incidenti nei residenti nelle province di Firenze e Prato. La sopravvivenza relativa a 5 anni rappresenta la proporzione di soggetti in vita a cinque anni dalla diagnosi aggiustata per la mortalità attesa, negli stessi periodi, nelle persone di pari età della popolazione generale.

