



Rimane costante l'incidenza del tumore del pancreas

Dati recentemente pubblicati documentano una diminuzione dell'incidenza del tumore del pancreas negli ultimi anni, rilevabile soprattutto negli uomini.

In Toscana tuttavia non risultano evidenti modifiche nel trend di incidenza. Il grafico riportato mostra i tassi di incidenza del tumore del pancreas del Registro Tumori della Regione Toscana dal 1985 al 2005, standardizzati secondo la struttura per età della popolazione europea (X 100.000); l'andamento medio nel periodo risulta stabile, con un trend simile nei due sessi (con un cambiamento percentuale annuo - APC - del tasso non significativo, APC: + 0.6 sia negli uomini che nelle donne). Nell'area coperta dal Registro Tumori della Regione Toscana, nel periodo 2003-2005, sono stati diagnosticati, in media ogni anno e ogni 100.000 soggetti, 18,1 nuovi casi di tumore del pancreas sia fra gli uomini che fra le donne;

questa neoplasia è risultata al nono posto in termini di frequenza nella popolazione maschile (2,5% del totale delle diagnosi tumorali) e all'ottavo nella popolazione femminile (3,1% del totale delle diagnosi tumorali) (www.ispo.toscana.it).

Tra i fattori di rischio per questo tipo di tumore sono stati indicati l'abitudine al fumo, l'abuso di alcolici, fattori dietetici, la presenza di diabete; in Toscana il decremento nel numero di fumatori, in particolare fra gli uomini, non sembra ancora aver influenzato l'andamento dell'incidenza del tumore del pancreas, a differenza di quanto recentemente documentato in altri paesi occidentali.

A. CALDARELLA, C. SACCHETTINI,
G. MANNESCHI, G. ROMEO, L. NEMCOVA,
A. CORBINELLI, T. INTRIERI


UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva,
ISPO Istituto per Studio e la Prevenzione Oncologica

Bibliografia

Le voci bibliografiche possono essere richieste a:
a.caldarella@ispo.toscana.it

TM

RTRT: Tumore del pancreas, incidenza per sesso



Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana (www.ispo.toscana.it) relativi ai residenti nelle province di Firenze e Prato. La standardizzazione per età è stata effettuata con il metodo diretto utilizzando la popolazione standard europea. La variazione media annuale percentuale dei tassi (APC) viene calcolata adattando ai dati una retta di regressione dei minimi quadrati sul logaritmo naturale dei tassi, utilizzando l'anno di calendario come variabile di regressione, secondo la procedura del software SEER*Stat.