



Adele Caldarella, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1991, specializzata in Anatomia Patologica nel 1997, è dirigente medico dal 2009 presso il Registro Toscano Tumori, U.O. Epidemiologia Clinica e Descrittiva, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (I.S.P.O.)

Trend di incidenza del tumore della colecisti in Toscana

Negli ultimi decenni l'incidenza del tumore maligno della colecisti, che presenta a livello internazionale una marcata variabilità geografica, risulta stabile o in diminuzione sia in Europa che in Italia, dove i dati relativi al periodo 2003-2005 rivelano che la diagnosi di neoplasia della colecisti costituisce l'1% delle diagnosi tumorali fra gli uomini e l'1,7% fra le donne.

I dati del Registro Tumori della Regione Toscana (RTRT) relativi ai tumori maligni della colecisti incidenti nel periodo 1985-2005 mostrano una diminuzione statisticamente significativa dei tassi standardizzati di incidenza del tumore della colecisti, passando da un tasso pari a 2.8 nel 1985 ad un tasso pari a 1.4 nel 2005 (cambiamento annuale del tasso di incidenza standardizzato APC: -4.2, CI 95% -5.1, -3.3). Analizzando i dati per

l'adozione di specifici stili di vita sono stati indagati come fattori di rischio per un tumore raro che nella nostra realtà non sembra più mostrare predilezioni di genere.

La presenza di calcoli biliari ma anche l'esistenza di patologie infettive a carico della colecisti o l'influenza di fattori metabolici e

l'adozione di specifici stili di vita sono stati indagati come fattori di rischio per un tumore raro che nella nostra realtà non sembra più mostrare predilezioni di genere.

A. CALDARELLA, C. SACCHETTINI, G. MANNESCHI, A. CORBINELLI, L. NEMCOVA, T. INTRIERI


UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva, ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Bibliografia

Le voci bibliografiche possono essere richieste a: a.caldarella@ispo.toscana.it

TM

Registro Tumori Toscano 1985-2005, incidenza del tumore della colecisti per sesso



Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana (www.ispo.toscana.it) relativi alle province di Firenze e Prato. La standardizzazione per età è stata effettuata con il metodo diretto utilizzando la popolazione standard europea. La variazione media annuale dei tassi (APC) viene calcolata adattando ai dati una retta di regressione dei minimi quadrati sul logaritmo naturale dei tassi, utilizzando l'anno di calendario come variabile di regressione, secondo la procedura del software SEER*Stat 6.1.